

Classe di priorità		B			D			P		
Descrizione prestazione	Anno 2025	Totale prenotazioni	Tempo medio di attesa	% di garanzia ex ante	Totale prenotazioni	Tempo medio di attesa	% di garanzia ex ante	Totale prenotazioni	Tempo medio di attesa	% di garanzia ex ante
COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Escluso: RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (45.24), PROCTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO RIGI	gen	64	9,1	90,6%	37	78,5	89,2%	45	345,3	15,6%
	feb	72	12,2	87,5%	27	47,6	96,3%	64	377,7	17,2%
	mar	90	19,7	75,6%	41	81,6	92,7%	63	406,8	14,3%
	apr	68	25,2	64,7%	36	50,4	86,1%	63	376,0	17,5%
	mag	80	26,9	60,0%	42	58,6	97,6%	32	343,4	25,0%
	giu	58	20,8	75,9%	27	36,8	100,0%	5	160,8	60,0%
	lug	68	24,8	69,1%	45	40,1	100,0%	6	67,0	66,7%
	ago	46	25,7	63,0%	37	46,6	97,3%	20	225,5	25,0%
	set	87	11,8	89,7%	75	77,7	88,0%	105	354,9	7,6%
	ott	88	10,1	95,5%	63	85,7	88,9%	102	441,0	10,8%
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (88.72.2)	gen	7	8,4	85,7%	38	54,3	78,9%	33	166,5	39,4%
	feb	12	17,6	75,0%	32	69,8	75,0%	34	177,4	35,3%
	mar	2	35,5	50,0%	15	94,9	33,3%	29	183,5	13,8%
	apr	2	6,5	100,0%	7	36,6	100,0%	7	142,4	0,0%
	mag	12	10,4	91,7%	3	86,0	66,7%	19	156,6	10,5%
	giu	6	7,7	100,0%	2	58,5	100,0%	23	150,3	13,0%
	lug	16	8,5	93,8%	6	32,0	100,0%	19	145,1	36,8%
	ago	8	4,9	100,0%	6	40,0	100,0%	9	127,6	55,6%
	set	7	3,6	100,0%	15	43,8	100,0%	12	89,2	75,0%
	ott	5	4,6	100,0%	12	34,3	91,7%	16	29,9	100,0%
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (88.72.3)	gen	5	20,4	80,0%	37	64,4	54,1%	35	144,1	60,0%
	feb	8	29,9	62,5%	59	69,6	55,9%	66	126,8	71,2%
	mar	8	32,3	50,0%	37	104,9	27,0%	61	150,5	29,5%
	apr	28	18,9	64,3%	50	47,8	88,0%	41	127,0	19,5%
	mag	28	19,3	78,6%	45	75,1	64,4%	59	146,4	13,6%
	giu	41	8,2	97,6%	42	62,5	78,6%	59	134,8	22,0%
	lug	39	7,2	97,4%	54	52,9	94,4%	71	122,4	49,3%
	ago	42	9,6	92,9%	44	48,2	100,0%	33	107,8	60,6%
	set	52	6,8	98,1%	98	44,9	99,0%	66	90,6	60,6%
	ott	58	5,3	96,6%	133	37,4	89,5%	114	66,5	81,6%
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacolog	gen	10	4,2	100,0%	31	56,7	96,8%	28	217,2	0,0%
	feb	12	9,3	83,3%	33	58,7	90,9%	43	162,5	37,2%
	mar	18	15,9	83,3%	60	52,3	90,0%	72	89,3	76,4%
	apr	15	15,1	86,7%	43	74,0	74,4%	43	127,0	41,9%
	mag	24	14,3	83,3%	41	64,0	73,2%	58	110,7	43,1%
	giu	20	8,2	100,0%	17	65,1	76,5%	42	139,4	19,0%
	lug	8	40,9	37,5%	34	62,2	76,5%	42	122,7	40,5%
	ago	9	25,8	66,7%	22	50,8	100,0%	9	135,9	22,2%
	set	20	10,4	95,0%	48	46,6	97,9%	63	103,5	36,5%
	ott	18	5,1	94,4%	40	49,8	90,0%	73	88,8	91,8%
ECOCOLOR DOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso: vasi viscerali	feb				1	72,0	0,0%			
	mar							1	54,0	100,0%
	apr	1	6,0	100,0%	2	32,5	100,0%	2	124,0	50,0%
	mag	2	8,5	100,0%	1	57,0	100,0%	4	141,8	25,0%
	giu				1	56,0	100,0%			

	set	1	7,0	100,0%						
	ott				2	35,0	100,0%	1	115,0	100,0%
ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Includa valutazione degli indici qualitativi e s	gen	5	3,8	100,0%	11	53,2	100,0%	12	178,1	0,0%
	feb	11	4,8	100,0%	16	56,9	87,5%	18	186,4	27,8%
	mar	13	10,4	92,3%	29	55,3	89,7%	18	57,6	94,4%
	apr	6	17,8	83,3%	10	67,0	80,0%	12	117,7	41,7%
	mag	7	23,0	71,4%	20	68,0	75,0%	17	138,3	11,8%
	giu	14	8,8	92,9%	5	153,2	0,0%	17	151,1	11,8%
	lug	8	14,6	87,5%	7	59,6	100,0%	10	110,7	60,0%
	ago	7	9,3	100,0%	5	45,4	100,0%	4	144,0	0,0%
	set	13	12,0	92,3%	14	48,4	92,9%	24	108,1	29,2%
	ott	9	4,7	100,0%	6	63,0	83,3%	22	82,4	86,4%
ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Includa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	gen	17	4,9	100,0%	17	52,2	100,0%	13	217,1	0,0%
	feb	14	4,0	100,0%	17	62,9	88,2%	28	203,5	10,7%
	mar	34	11,0	91,2%	24	53,4	91,7%	37	101,3	73,0%
	apr	10	13,7	80,0%	30	67,5	76,7%	35	128,9	45,7%
	mag	24	10,1	95,8%	39	83,1	51,3%	42	133,3	28,6%
	giu	25	11,5	92,0%	19	78,1	73,7%	32	126,7	18,8%
	lug	31	25,8	61,3%	29	59,1	93,1%	28	126,1	35,7%
	ago	24	25,5	54,2%	29	56,3	96,6%	12	144,9	0,0%
	set	25	16,2	80,0%	39	44,6	100,0%	46	111,3	34,8%
	ott	21	5,6	100,0%	25	61,3	80,0%	57	84,9	89,5%
ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Includa valutazione degli indici qualitativi e	gen				1	60,0	100,0%			
	feb	1	7,0	100,0%				3	174,3	33,3%
	mar	1	10,0	100,0%	1	60,0	100,0%			
	apr							1	145,0	0,0%
	mag							1	20,0	100,0%
	ago	2	7,0	100,0%						
	set							1	9,0	100,0%
	ott							6	95,0	100,0%
ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Includa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi	gen	1	6,0	100,0%						
	feb	1	7,0	100,0%						
	mar	3	9,3	100,0%	4	55,5	100,0%	1	188,0	0,0%
	mag	5	7,2	100,0%				2	154,0	0,0%
	giu	2	10,0	100,0%				1	152,0	0,0%
	lug				1	60,0	100,0%			
	ago	5	29,2	60,0%	2	59,0	100,0%			
	set				4	59,5	100,0%	1	13,0	100,0%
	ott	2	3,0	100,0%	2	109,0	0,0%			
	gen	4	34,0	50,0%	5	78,6	80,0%	6	464,7	0,0%
ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare. Includo: color Doppler se necessario. Includo: eventuale valutazione clinica	feb	3	24,3	66,7%	9	119,3	88,9%	8	407,3	0,0%
	mar	10	24,5	70,0%	1	59,0	100,0%	1	630,0	0,0%
	apr	8	8,3	100,0%	4	45,8	100,0%	1	482,0	0,0%
	mag	6	9,8	83,3%	6	58,2	100,0%	1	525,0	0,0%
	giu	7	8,4	100,0%	5	58,2	100,0%	3	395,3	0,0%
	lug	9	32,9	55,6%	8	158,4	75,0%	5	467,2	0,0%
	ago	1	52,0	0,0%	5	46,0	100,0%	7	529,0	0,0%
	set	7	32,3	57,1%	5	58,6	100,0%	6	597,5	0,0%
	ott	12	29,0	66,7%	3	274,7	66,7%	11	661,2	0,0%

ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandol	gen	46	7,8	87,0%	45	19,1	100,0%	93	70,6	59,1%
	feb	37	8,1	86,5%	96	22,2	99,0%	133	65,5	81,2%
	mar	49	3,8	98,0%	135	23,9	89,6%	115	88,3	92,2%
	apr	46	6,8	93,5%	127	21,2	97,6%	106	89,5	74,5%
	mag	56	5,9	94,6%	135	30,7	88,1%	141	90,9	83,7%
	giu	42	6,6	88,1%	128	25,2	90,6%	112	91,4	88,4%
	lug	55	6,5	98,2%	97	29,7	87,6%	126	92,1	87,3%
	ago	20	7,1	85,0%	94	27,1	88,3%	83	91,9	90,4%
	set	39	5,1	97,4%	121	31,2	84,3%	133	94,9	78,9%
	ott	47	4,8	97,9%	154	26,2	92,2%	147	88,3	88,4%
ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Incluso: Colordoppler se necessario. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1, 88.78.1	gen	38	9,9	73,7%	89	15,3	98,9%	93	37,8	96,8%
	feb	38	5,6	94,7%	89	15,6	94,4%	78	35,1	98,7%
	mar	59	4,9	93,2%	123	11,0	99,2%	108	37,3	98,1%
	apr	71	6,0	91,5%	108	14,4	99,1%	92	36,2	96,7%
	mag	66	5,0	98,5%	117	11,6	99,1%	103	40,7	98,1%
	giu	54	5,4	98,1%	109	12,4	97,2%	83	45,9	96,4%
	lug	60	6,3	95,0%	119	16,6	96,6%	108	41,3	100,0%
	ago	56	6,4	87,5%	88	18,0	98,9%	85	50,7	97,6%
	set	73	5,3	98,6%	137	17,0	97,8%	104	55,3	97,1%
	ott	67	5,4	97,0%	152	19,6	98,7%	137	51,0	100,0%
ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia sovrapubica. Incluso: Co	gen	6	12,3	66,7%	20	14,7	100,0%	24	26,0	100,0%
	feb	13	4,5	100,0%	12	9,0	100,0%	19	47,4	100,0%
	mar	15	4,7	93,3%	21	18,0	90,5%	13	22,2	100,0%
	apr	6	6,8	83,3%	11	12,5	100,0%	20	29,2	100,0%
	mag	8	4,4	100,0%	23	11,0	95,7%	22	33,3	100,0%
	giu	13	6,6	92,3%	17	10,3	100,0%	13	44,5	100,0%
	lug	6	5,7	100,0%	14	19,8	92,9%	18	42,3	94,4%
	ago	5	9,8	60,0%	9	17,4	100,0%	23	52,7	100,0%
	set	7	3,3	100,0%	13	27,5	92,3%	24	45,9	100,0%
	ott	12	3,3	100,0%	19	16,2	100,0%	26	51,3	100,0%
ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi	gen	8	9,0	75,0%	17	27,9	88,2%	15	46,5	80,0%
	feb	6	5,5	100,0%	9	15,6	88,9%	6	42,2	100,0%
	mar	5	6,4	100,0%	19	15,5	94,7%	12	33,4	100,0%
	apr	10	4,9	100,0%	18	10,9	100,0%	7	34,9	100,0%
	mag	7	4,4	100,0%	10	31,7	100,0%	8	42,9	87,5%
	giu	8	4,6	100,0%	13	11,8	100,0%	11	65,5	81,8%
	lug	11	7,0	90,9%	15	14,6	100,0%	7	36,1	100,0%
	ago	2	5,0	100,0%	10	10,3	100,0%	4	45,0	100,0%
	set	7	5,6	100,0%	13	11,5	100,0%	12	53,7	100,0%
	ott	3	4,7	100,0%	25	22,3	96,0%	9	50,6	100,0%
ECOGRAFIA GINECOLOGICA con sonda transvaginale o addominale. Incluso: colordoppler se necessario. Non associabile a ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE (8	gen	4	7,3	100,0%	3	83,7	66,7%	22	276,9	13,6%
	feb	6	7,8	83,3%	2	51,5	100,0%	10	287,2	10,0%
	mar	4	10,0	75,0%	5	58,0	100,0%	21	313,7	4,8%
	apr	7	15,4	85,7%	7	82,6	85,7%	12	353,4	8,3%
	mag	8	24,6	75,0%	7	173,3	0,0%	16	338,6	12,5%
	giu	5	42,2	60,0%	6	254,5	16,7%	11	377,4	9,1%
	lug	6	33,5	50,0%	9	89,9	33,3%	16	232,9	37,5%
	ago	3	42,7	33,3%	2	59,0	100,0%	1	400,0	0,0%
	set	7	21,1	71,4%	7	149,3	57,1%	12	287,2	0,0%

	ott	7	7,6	100,0%	14	88,9	35,7%	32	198,5	31,3%
ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso: ecografia del cavo ascellare ed eventuale integrazione Colordoppler. Incluso: eventuale valutazione cl	gen							1	227,0	0,0%
	feb							1	230,0	0,0%
	apr				1	59,0	100,0%			
	ago	1	58,0	0,0%						
ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione colordoppler	gen	12	3,8	100,0%	21	33,0	100,0%	6	133,0	0,0%
	feb	24	4,2	100,0%	22	35,3	100,0%	18	131,3	5,6%
	mar	16	4,5	100,0%	15	34,7	100,0%	14	126,2	28,6%
	apr	19	4,2	100,0%	8	43,1	100,0%	10	138,1	0,0%
	mag	12	4,4	100,0%	29	45,1	100,0%	8	140,3	12,5%
	giu	15	3,7	100,0%	12	48,8	100,0%	8	138,9	12,5%
	lug	16	21,9	68,8%	16	54,8	100,0%	10	172,6	0,0%
	ago	9	6,3	100,0%	13	56,8	100,0%	4	168,0	0,0%
	set	13	4,5	100,0%	14	51,6	100,0%	3	178,7	0,0%
	ott	14	3,7	100,0%	31	57,6	100,0%	19	175,9	15,8%
	gen	7	10,6	57,1%	9	16,4	100,0%	21	17,1	100,0%
	feb	4	9,5	50,0%	8	17,9	100,0%	24	19,1	100,0%
ECOGRAFIA OSTETRICA	mar	7	10,7	57,1%	11	9,1	100,0%	20	16,1	100,0%
	apr	4	13,8	50,0%	7	15,6	100,0%	27	20,1	100,0%
	mag	5	14,2	40,0%	4	14,8	100,0%	43	29,4	100,0%
	giu	18	25,4	22,2%	3	25,3	100,0%	32	25,2	100,0%
	lug	13	35,5	15,4%	11	14,3	100,0%	19	24,5	100,0%
	ago	2	35,0	0,0%	3	14,3	100,0%	16	24,6	100,0%
	set	8	12,9	50,0%	5	20,8	80,0%	24	22,8	100,0%
	ott	3	9,3	66,7%	5	16,4	100,0%	32	24,6	100,0%
	gen	2	6,0	100,0%	4	7,5	100,0%	2	23,5	100,0%
	feb	3	3,7	100,0%	1	47,0	100,0%	4	21,3	100,0%
ECOGRAFIA SCROTALE. Incluso: testicoli e annessi testicolari. Incluso: integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1	mar	3	1,7	100,0%	3	14,7	100,0%	2	24,5	100,0%
	apr	2	3,0	100,0%	2	8,0	100,0%	1	25,0	100,0%
	mag				1	7,0	100,0%	5	34,0	100,0%
	giu	1	3,0	100,0%	1	7,0	100,0%	2	34,0	100,0%
	lug	5	6,2	80,0%	4	7,3	100,0%	3	19,7	100,0%
	ago	1	6,0	100,0%	1	48,0	100,0%			
	set	4	4,5	100,0%	2	13,5	100,0%	2	47,0	100,0%
	ott	2	2,5	100,0%	1	15,0	100,0%	5	38,4	100,0%
	gen	8	17,4	0,0%	12	17,2	100,0%	4	32,3	100,0%
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (secondo Holter)	feb	6	13,3	16,7%	9	14,2	100,0%	11	25,5	100,0%
	mar	5	11,2	40,0%	10	11,6	100,0%	11	11,1	100,0%
	apr	10	7,7	90,0%	8	12,5	100,0%	7	10,3	100,0%
	mag	4	6,8	100,0%	16	9,6	100,0%	13	11,6	100,0%
	giu	5	5,4	100,0%	10	6,0	100,0%	8	15,1	100,0%
	lug	10	5,1	100,0%	13	9,9	100,0%	16	26,3	100,0%
	ago	11	4,3	90,9%	3	16,3	100,0%	6	11,7	100,0%
	set	5	7,4	100,0%	9	8,4	100,0%	10	11,8	100,0%
	ott	7	4,7	100,0%	14	4,1	100,0%	10	8,5	100,0%
	gen	30	7,1	90,0%	59	41,3	93,2%	71	88,9	69,0%
ELETTROCARDIOGRAMMA. Non associabile a Prima	feb	20	13,3	75,0%	50	50,4	96,0%	53	117,6	58,5%
	mar	8	32,9	50,0%	13	76,6	69,2%	20	159,6	25,0%
	apr	2	7,0	100,0%	2	28,0	100,0%	3	67,7	66,7%

ELETTROCARDIOGRAMMA. Non associabile a prima visita cardiologica (89.7A.3), Visita cardiologica di controllo (89.01.3)	mag	10	6,5	100,0%	3	66,7	66,7%	8	169,5	12,5%
	giu	2	9,5	100,0%	2	37,0	100,0%	6	156,3	16,7%
	lug	5	3,4	100,0%	4	28,0	100,0%	5	103,0	60,0%
	ago	8	9,6	87,5%	1	57,0	100,0%	1	127,0	0,0%
	set	5	3,6	100,0%	1	9,0	100,0%	3	31,7	100,0%
	ott	7	3,0	100,0%				5	31,8	100,0%
ELETTRROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Incluse tutte le fibre indagabili. Analisi qualitativa. Non associabile a 93.09.1	gen				8	82,1	37,5%	12	94,6	83,3%
	feb				10	30,6	80,0%	67	106,1	23,9%
	mar	10	116,2	0,0%	26	63,8	61,5%	20	143,2	0,0%
	apr				10	119,6	20,0%	52	123,6	15,4%
	mag	8	3,0	100,0%	10	125,2	0,0%	77	116,5	22,1%
	giu	1	62,0	0,0%	10	99,0	0,0%	24	109,2	66,7%
	lug				2	85,0	0,0%	29	83,6	86,2%
	ago	2	133,0	0,0%	4	93,0	50,0%	14	66,9	85,7%
	set				14	32,6	100,0%	54	76,5	64,8%
	ott				32	119,0	0,0%	56	99,4	62,5%
ELETTRROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. Incluse tutte le fibre indagabili. Non associabile a 93.09.1	gen	8	117,0	0,0%	4	118,0	0,0%	34	106,7	70,6%
	feb				8	132,3	0,0%	69	127,4	11,6%
	mar				12	127,7	0,0%	57	127,1	14,0%
	apr				14	105,1	28,6%	68	104,6	38,2%
	mag				26	106,4	7,7%	28	126,1	28,6%
	giu				8	105,0	0,0%	34	115,8	58,8%
	lug				10	133,6	0,0%	31	86,5	74,2%
	ago	2	133,0	0,0%	8	119,0	25,0%	16	56,7	93,8%
	set				8	50,5	75,0%	16	75,9	62,5%
	ott				6	110,3	0,0%	27	106,2	81,5%
ESAME AUDIOMETRICO TONALE	gen	3	16,0	0,0%	16	20,3	100,0%	21	17,9	100,0%
	feb	4	18,5	0,0%	19	25,4	89,5%	36	20,4	100,0%
	mar	11	19,7	0,0%	17	20,2	100,0%	34	28,5	97,1%
	apr	4	18,3	25,0%	15	26,5	100,0%	30	27,5	100,0%
	mag	3	25,3	0,0%	21	29,2	90,5%	35	28,7	100,0%
	giu	3	21,0	0,0%	10	25,2	100,0%	40	25,6	97,5%
	lug	6	35,2	0,0%	16	36,9	93,8%	43	37,9	95,3%
	ago	5	38,0	0,0%	11	52,4	81,8%	27	38,1	100,0%
	set				21	40,8	100,0%	50	38,5	100,0%
	ott	5	5,0	100,0%	25	44,4	100,0%	49	73,3	91,8%
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA IN SEDE UNICA. Non associabile a: Biopsia dell'esofago (42.24 E 42.24.1); Biopsia dello stomaco (44.14);	gen	6	7,3	100,0%	2	59,0	100,0%	3	237,0	0,0%
	feb	6	5,3	100,0%	2	7,0	100,0%	1	5,0	100,0%
	mar	2	7,0	100,0%	2	58,5	100,0%	4	235,3	0,0%
	apr	7	29,6	57,1%	1	8,0	100,0%	6	242,8	16,7%
	mag	2	7,0	100,0%				3	268,0	0,0%
	giu	2	7,5	100,0%				2	421,5	0,0%
	lug	2	34,0	50,0%	1	59,0	100,0%	1	118,0	100,0%
	ago	1	8,0	100,0%	1	59,0	100,0%	1	376,0	0,0%
	set	4	6,8	100,0%	5	56,8	80,0%	3	309,7	0,0%
	ott	1	9,0	100,0%	1	76,0	0,0%			
	gen	47	12,0	85,1%	41	106,1	78,0%	22	270,8	18,2%
	feb	44	9,7	93,2%	41	79,1	87,8%	31	282,0	16,1%
	mar	52	19,5	78,8%	37	51,6	91,9%	35	239,1	17,1%

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS]. Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica (45.16.1), Esofagogastroduodenoscopia con bi	apr	56	20,1	75,0%	41	54,8	82,9%	37	253,9	32,4%
	mag	54	24,3	66,7%	28	65,8	85,7%	38	256,4	18,4%
	giu	35	13,0	82,9%	27	40,5	96,3%	38	324,0	21,1%
	lug	51	21,2	76,5%	41	52,2	90,2%	35	189,8	42,9%
	ago	27	23,8	63,0%	36	53,0	91,7%	34	241,6	23,5%
	set	46	9,1	95,7%	45	72,3	80,0%	44	274,5	18,2%
	ott	60	9,7	95,0%	49	81,9	83,7%	57	303,2	8,8%
	gen	3	17,3	0,0%	9	20,1	100,0%	11	16,7	100,0%
	feb	2	15,0	0,0%	12	25,9	83,3%	22	18,1	100,0%
	mar	8	19,5	0,0%	11	26,0	90,9%	26	38,6	96,2%
IMPEDENZOMETRIA	apr	5	20,0	20,0%	11	26,1	100,0%	18	30,9	100,0%
	mag	2	24,5	0,0%	16	28,4	93,8%	15	28,9	100,0%
	giu	2	12,5	50,0%	5	20,0	100,0%	21	34,8	90,5%
	lug	3	33,0	0,0%	13	41,7	92,3%	20	43,9	100,0%
	ago	2	33,5	0,0%	4	51,5	75,0%	13	34,9	100,0%
	set				14	45,7	100,0%	27	40,3	100,0%
	ott	6	6,2	100,0%	13	44,4	100,0%	40	78,1	90,0%
	gen	12	6,2	100,0%	1	6,0	100,0%	11	29,3	90,9%
	feb	17	8,5	94,1%	6	17,2	100,0%	22	14,6	100,0%
	mar	19	7,6	94,7%	5	16,6	100,0%	20	23,5	100,0%
MAMMOGRAFIA BILATERALE	apr	21	7,1	95,2%	3	18,0	100,0%	4	14,5	100,0%
	mag	12	8,1	100,0%	3	14,7	100,0%	7	11,0	100,0%
	giu	18	4,6	100,0%	6	13,0	100,0%	4	38,3	100,0%
	lug	16	4,6	93,8%	4	56,8	75,0%	5	6,2	100,0%
	ago	9	4,0	100,0%	3	10,7	100,0%	5	26,4	100,0%
	set	16	5,4	100,0%	5	6,4	100,0%	8	42,3	100,0%
	ott	25	8,3	92,0%	3	9,7	100,0%	11	13,1	100,0%
	gen	1	3,0	100,0%						
	mag	1	9,0	100,0%						
	giu	2	3,5	100,0%						
MAMMOGRAFIA MONOLATERALE	ago	2	6,0	100,0%						
	gen	1	7,0	100,0%	3	16,3	100,0%	4	9,3	100,0%
	feb	1	5,0	100,0%				4	9,8	100,0%
	mar	1	7,0	100,0%	7	8,4	100,0%	12	5,3	100,0%
ORTOPANORAMICA DELLE ARCATI DENTARIE. Arcate dentarie complete superiore e inferiore (OPT)	apr	2	8,5	50,0%	3	3,7	100,0%	7	2,6	100,0%
	mag	3	3,0	100,0%	7	7,4	100,0%	4	4,5	100,0%
	giu	2	6,5	100,0%	5	17,8	100,0%	2	2,5	100,0%
	lug				4	15,8	100,0%	1	1,0	100,0%
	ago	2	2,0	100,0%	4	9,0	100,0%	3	19,0	100,0%
	set	1	1,0	100,0%	3	4,7	100,0%	3	5,3	100,0%
	ott	3	3,3	100,0%	3	2,3	100,0%	8	2,0	100,0%
	gen	84	9,9	78,6%	152	38,5	45,4%	179	82,4	74,9%
	feb	99	12,3	76,8%	181	47,9	26,0%	189	94,7	72,0%
	mar	93	14,1	76,3%	119	50,1	22,7%	166	103,3	62,7%
PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52)	apr	89	8,7	91,0%	120	33,9	47,5%	108	56,9	84,3%
	mag	129	8,3	93,0%	139	31,7	79,9%	152	96,2	54,6%
	giu	102	6,9	93,1%	119	27,8	75,6%	136	83,5	64,0%
	lug	115	5,2	93,9%	115	24,1	70,4%	162	80,7	77,2%
	ago	96	5,3	94,8%	117	31,1	59,0%	106	56,2	85,8%

	set	123	4,9	96,7%	178	29,6	50,6%	168	49,6	83,9%
	ott	113	3,8	99,1%	259	21,1	75,7%	233	45,8	90,1%
PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE	gen	18	5,8	94,4%	10	53,4	20,0%	9	189,2	11,1%
	feb	14	8,6	92,9%	11	66,2	18,2%	13	191,5	23,1%
	mar	26	7,3	100,0%	17	62,4	17,6%	13	98,5	69,2%
	apr	15	9,4	93,3%	19	56,6	10,5%	12	118,7	41,7%
	mag	20	8,9	90,0%	16	13,6	81,3%	26	44,3	84,6%
	giu	20	10,1	85,0%	22	7,5	100,0%	12	33,1	83,3%
	lug	14	15,7	57,1%	19	26,8	78,9%	19	42,4	94,7%
	ago	16	19,2	31,3%	13	22,5	100,0%	10	30,4	100,0%
	set	14	9,4	92,9%	10	25,6	60,0%	16	36,2	81,3%
	ott	20	3,5	100,0%	19	7,4	94,7%	12	22,8	100,0%
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA Incluso: Eventuale osservazione in epiluminescenza	gen	29	5,7	100,0%	43	59,4	11,6%	41	176,8	22,0%
	feb	39	6,8	97,4%	47	60,6	21,3%	75	194,7	17,3%
	mar	58	5,7	96,6%	50	55,4	20,0%	75	187,3	22,7%
	apr	38	11,1	86,8%	53	47,7	18,9%	64	164,2	42,2%
	mag	48	7,7	95,8%	53	55,6	17,0%	80	221,9	17,5%
	giu	52	5,1	100,0%	37	56,6	32,4%	64	184,1	32,8%
	lug	52	6,3	100,0%	72	53,4	20,8%	68	140,1	67,6%
	ago	33	8,2	90,9%	50	52,8	22,0%	57	113,1	57,9%
	set	42	3,7	100,0%	57	44,1	33,3%	65	202,4	21,5%
	ott	41	5,0	92,7%	82	37,0	50,0%	104	94,9	56,7%
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA. Incluso: eventuale stesura del piano nutrizionale	gen	102	9,5	90,2%	139	27,6	85,6%	117	111,4	45,3%
	feb	115	6,9	94,8%	164	23,8	89,6%	150	81,2	75,3%
	mar	136	7,8	91,2%	243	23,9	85,6%	245	75,3	95,5%
	apr	130	9,4	87,7%	253	26,0	85,0%	191	83,8	85,9%
	mag	154	8,2	92,2%	258	30,5	73,6%	262	77,4	88,9%
	giu	143	6,3	97,2%	208	24,4	91,3%	186	90,5	87,6%
	lug	129	5,4	97,7%	186	19,6	92,5%	206	73,0	92,2%
	ago	98	7,3	85,7%	145	23,0	90,3%	150	63,4	92,0%
	set	99	6,2	94,9%	202	21,1	96,0%	204	66,5	89,2%
	ott	141	5,3	97,9%	271	20,4	92,6%	237	63,2	97,0%
PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA	gen	16	9,7	93,8%	16	95,6	6,3%	15	161,3	20,0%
	feb	12	18,4	75,0%	11	88,6	9,1%	32	217,8	15,6%
	mar	19	23,5	68,4%	11	77,8	27,3%	33	224,1	12,1%
	apr	8	17,8	75,0%	11	79,7	0,0%	29	189,2	31,0%
	mag	15	27,4	66,7%	15	103,2	13,3%	22	246,2	13,6%
	giu	12	8,0	100,0%	11	61,4	27,3%	32	251,2	9,4%
	lug	20	22,9	70,0%	13	71,0	7,7%	27	149,5	44,4%
	ago	9	13,1	77,8%	4	65,3	0,0%	23	210,1	13,0%
	set	12	13,0	83,3%	20	65,9	10,0%	44	186,4	20,5%
	ott	19	16,4	78,9%	28	76,4	17,9%	46	201,1	15,2%
PRIMA VISITA GINECOLOGICA. Incluso: eventuale prelievo citologico, eventuali indicazioni in funzione anticoncezionale e preconcezionale. Non associabi	gen	11	6,2	90,9%	25	59,9	36,0%	75	137,2	34,7%
	feb	15	16,8	73,3%	21	78,9	23,8%	71	146,7	9,9%
	mar	18	13,5	88,9%	18	60,5	33,3%	90	156,0	26,7%
	apr	13	6,5	100,0%	15	78,5	26,7%	63	150,0	14,3%
	mag	24	12,7	83,3%	21	86,2	9,5%	63	170,8	14,3%
	giu	20	16,0	85,0%	18	71,8	50,0%	66	145,2	36,4%
	lug	19	11,2	89,5%	28	62,0	32,1%	64	119,9	48,4%

	ago	10	22,6	80,0%	21	57,8	23,8%	22	118,7	50,0%
	set	24	12,5	91,7%	27	78,8	11,1%	55	125,9	38,2%
	ott	25	16,9	88,0%	47	65,6	10,6%	89	95,6	68,5%
	gen	12	3,6	91,7%	19	62,9	0,0%	11	91,1	90,9%
PRIMA VISITA NEFROLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento conservativo (dietetico e farmacologico), sostitutivo (dialisi extracorporea o per	feb	20	14,4	80,0%	20	75,2	5,0%	10	87,4	100,0%
	mar	20	7,9	95,0%	26	71,9	0,0%	26	108,5	96,2%
	apr	19	5,3	100,0%	21	68,6	0,0%	18	129,3	38,9%
	mag	16	10,4	93,8%	27	65,1	7,4%	30	130,0	20,0%
	giu	20	13,4	85,0%	14	64,7	0,0%	32	123,2	40,6%
	lug	18	9,3	94,4%	28	48,0	17,9%	19	130,4	42,1%
	ago	16	8,1	93,8%	19	62,7	0,0%	12	95,3	41,7%
	set	18	7,2	100,0%	21	50,2	9,5%	22	135,4	4,5%
	ott	39	5,2	97,4%	31	52,3	16,1%	24	92,4	45,8%
	gen	59	3,5	96,6%	106	49,6	13,2%	90	159,9	48,9%
PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: ESAME DEL VISUS, REFRAZIONE CON EVENTUALE PRESCRIZIONE DI LENTI, TONOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, FUNDUS OCULI CON O SENZ	feb	89	5,0	98,9%	122	50,6	35,2%	210	126,0	45,2%
	mar	96	7,1	93,8%	148	54,8	20,9%	147	185,2	22,4%
	apr	58	8,7	93,1%	107	40,0	33,6%	123	167,3	31,7%
	mag	98	5,6	96,9%	123	45,7	35,0%	174	135,2	38,5%
	giu	87	8,4	94,3%	77	46,8	48,1%	143	176,7	25,2%
	lug	63	10,6	87,3%	145	53,7	19,3%	163	173,4	41,7%
	ago	36	13,8	80,6%	110	47,6	19,1%	96	185,2	32,3%
	set	80	4,7	98,8%	168	42,1	29,8%	171	136,8	41,5%
	ott	95	4,4	97,9%	150	49,2	38,7%	254	151,3	40,9%
	gen	15	7,8	80,0%	24	17,3	87,5%	34	19,9	100,0%
PRIMA VISITA ONCOLOGICA. Incluso: stesura del piano di trattamento	feb	9	7,9	88,9%	27	17,7	81,5%	30	17,2	100,0%
	mar	18	10,6	55,6%	27	13,7	100,0%	26	14,8	100,0%
	apr	16	11,0	50,0%	25	17,0	92,0%	18	19,2	100,0%
	mag	33	7,8	84,8%	31	16,7	87,1%	27	21,9	100,0%
	giu	18	9,1	61,1%	24	20,3	87,5%	20	28,4	100,0%
	lug	25	10,0	80,0%	15	14,7	86,7%	22	44,8	95,5%
	ago	14	13,6	50,0%	20	26,5	60,0%	25	33,6	100,0%
	set	12	18,4	41,7%	27	20,0	88,9%	29	18,8	100,0%
	ott	19	8,3	89,5%	30	17,6	96,7%	17	20,1	100,0%
	gen	28	10,7	82,1%	20	51,6	35,0%	37	145,5	29,7%
PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per prescrizione di plantare	feb	30	12,2	80,0%	33	56,4	45,5%	50	151,7	26,0%
	mar	40	14,0	75,0%	33	48,0	51,5%	75	152,7	24,0%
	apr	28	12,9	78,6%	26	43,5	38,5%	45	187,4	13,3%
	mag	32	11,6	78,1%	34	59,5	35,3%	50	110,0	46,0%
	giu	33	8,9	93,9%	39	52,6	35,9%	40	135,8	35,0%
	lug	37	12,9	67,6%	61	53,3	26,2%	49	78,1	81,6%
	ago	28	10,0	96,4%	28	43,1	32,1%	48	111,9	58,3%
	set	35	12,9	91,4%	75	70,6	36,0%	79	110,1	58,2%
	ott	40	9,7	95,0%	51	63,1	29,4%	87	114,9	41,4%
	gen	12	11,2	83,3%	32	41,9	31,3%	59	44,4	96,6%
PRIMA VISITA OSTETRICA. Incluso: eventuale prelievo citologico. Non associabile a 89.26.1 PRIMA VISITA GINECOLOGICA	feb	9	9,1	77,8%	30	37,5	40,0%	52	45,3	96,2%
	mar	13	14,4	69,2%	44	41,9	38,6%	61	47,2	98,4%
	apr	9	10,9	66,7%	30	49,1	40,0%	72	54,0	98,6%
	mag	28	15,3	67,9%	26	37,6	46,2%	78	49,7	97,4%
	giu	12	16,3	50,0%	49	64,0	30,6%	87	61,4	95,4%

PRIMA VISITA GINECOLOGICA	lug	17	17,9	64,7%	41	43,0	24,4%	90	58,0	97,8%
	ago	14	28,7	50,0%	30	46,2	16,7%	65	48,5	100,0%
	set	24	16,9	50,0%	15	46,5	33,3%	81	44,6	98,8%
	ott	16	14,8	56,3%	38	39,9	31,6%	76	41,9	100,0%
PRIMA VISITA OTORINOLARINGOIATRIA. Incluso, in base allo specifico problema clinico: eventuale otomicroscopia, esame funzionalità vestibolare, utilizz	gen	61	5,7	90,2%	39	60,6	17,9%	47	110,4	59,6%
	feb	65	13,2	90,8%	38	79,3	18,4%	60	238,5	6,7%
	mar	68	11,2	94,1%	46	66,5	8,7%	49	223,7	4,1%
	apr	67	10,8	94,0%	37	50,8	10,8%	46	246,6	0,0%
	mag	65	10,5	89,2%	61	66,9	3,3%	46	174,5	19,6%
	giu	64	8,4	100,0%	23	59,5	26,1%	36	207,5	0,0%
	lug	69	8,3	98,6%	58	59,3	8,6%	71	140,4	46,5%
	ago	36	12,8	88,9%	46	60,9	2,2%	48	132,1	66,7%
	set	79	7,6	97,5%	54	58,6	13,0%	61	201,5	14,8%
	ott	98	6,0	95,9%	66	74,3	3,0%	93	150,9	25,8%
PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA. Incluso: eventuale rilevazione incruenta della saturazione arteriosa	gen	21	18,4	81,0%	19	59,4	5,3%	31	243,9	0,0%
	feb	22	16,0	86,4%	18	53,5	11,1%	31	270,9	6,5%
	mar	26	17,9	76,9%	25	102,9	8,0%	36	248,9	2,8%
	apr	24	13,9	83,3%	22	102,7	0,0%	29	263,8	0,0%
	mag	20	16,8	85,0%	46	89,9	6,5%	31	217,8	12,9%
	giu	31	10,9	93,5%	25	96,5	20,0%	31	206,6	29,0%
	lug	33	19,8	81,8%	37	58,8	2,7%	37	239,4	45,9%
	ago	14	20,9	78,6%	38	54,8	13,2%	23	184,9	43,5%
	set	46	15,6	91,3%	64	63,3	23,4%	36	234,8	11,1%
RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Endoscopia del colon discendente . Escluso: Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido (48.23). Non ass	ott	71	7,2	98,6%	42	79,0	19,0%	56	263,7	8,9%
	feb							1	373,0	0,0%
	mar	1	9,0	100,0%				1	138,0	0,0%
	apr	2	51,0	0,0%						
	mag	1	10,0	100,0%	1	60,0	100,0%			
	giu	2	4,0	100,0%						
RM DEL COLLO [faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidj]. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGI	lug				1	9,0	100,0%			
	set							1	349,0	0,0%
	giu	1	6,0	100,0%						
RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC (88.93.B)	gen	1	59,0	0,0%						
	feb							1	143,0	0,0%
	mar	1	61,0	0,0%	2	60,0	100,0%	4	235,8	0,0%
	apr	2	21,0	50,0%	2	36,0	100,0%	1	29,0	100,0%
	mag	2	9,0	100,0%				6	148,5	0,0%
	giu							1	115,0	100,0%
	lug							4	168,5	50,0%
	ago	3	31,0	33,3%				1	35,0	100,0%
	set				1	58,0	100,0%	7	238,0	0,0%
RM DEL RACHIDE CERVICALE. Non associabile a RM	ott	6	7,3	100,0%	3	70,7	66,7%	1	99,0	100,0%
	gen	6	25,2	66,7%	3	58,0	100,0%			
	feb	9	11,3	88,9%	5	97,4	60,0%	2	163,5	0,0%
	mar	10	19,4	80,0%	2	59,0	100,0%	7	186,9	14,3%
	apr	14	18,1	71,4%	19	31,4	100,0%	9	71,1	66,7%
	maq	2	38,0	50,0%	2	56,5	100,0%	4	158,0	0,0%

DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	giu	5	16,6	80,0%	1	15,0	100,0%	6	135,0	33,3%
	lug	3	44,0	33,3%				10	145,9	60,0%
	ago	11	30,7	36,4%	3	58,7	100,0%			
	set	9	17,3	77,8%	5	43,0	80,0%	10	165,1	30,0%
	ott	12	7,3	100,0%	16	68,0	68,8%	19	106,1	73,7%
RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC (88.93.B)	gen	2	34,0	50,0%						
	feb	1	6,0	100,0%				1	146,0	0,0%
	mar	1	8,0	100,0%	2	60,0	100,0%	5	234,6	0,0%
	apr	1	34,0	0,0%	1	12,0	100,0%			
	mag	2	9,0	100,0%				4	158,8	0,0%
	giu							1	115,0	100,0%
	lug	2	64,5	0,0%				2	239,0	0,0%
	ago	1	7,0	100,0%				1	57,0	100,0%
	set							6	236,7	0,0%
	ott	7	7,6	100,0%	3	71,3	66,7%			
	gen	3	43,7	33,3%	2	59,5	100,0%			
	feb	2	6,5	100,0%	2	59,5	100,0%	1	153,0	0,0%
RM DEL RACHIDE DORSALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	mar	1	9,0	100,0%				1	198,0	0,0%
	apr	6	12,5	66,7%	6	21,3	100,0%	3	19,7	100,0%
	mag	4	32,5	50,0%	2	97,0	50,0%	1	128,0	0,0%
	giu	5	17,8	80,0%				5	141,6	40,0%
	lug							4	154,8	50,0%
	ago	2	51,0	0,0%						
	set	2	8,0	100,0%	2	57,0	100,0%	2	151,0	50,0%
	ott	6	7,8	100,0%	4	102,5	0,0%	6	117,8	50,0%
	gen	4	30,3	50,0%						
	feb	1	6,0	100,0%						
	mar	2	33,5	50,0%	1	7,0	100,0%	2	224,5	0,0%
	apr				2	71,0	50,0%			
RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC (88.93.B)	mag	1	9,0	100,0%				1	131,0	0,0%
	giu							3	123,0	33,3%
	lug				1	203,0	0,0%	2	228,0	0,0%
	ago	1	54,0	0,0%				1	35,0	100,0%
	set	1	60,0	0,0%	3	47,3	100,0%	5	230,8	0,0%
	ott	8	8,4	100,0%	4	55,8	75,0%	2	114,0	50,0%
	gen	17	24,9	52,9%	12	58,5	100,0%			
	feb	14	11,9	92,9%	7	76,6	71,4%	7	157,0	0,0%
	mar	16	47,3	50,0%	7	70,0	71,4%	11	185,2	9,1%
	apr	29	20,9	51,7%	31	30,2	96,8%	16	76,8	62,5%
RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	mag	16	29,1	62,5%	5	46,0	100,0%	20	158,3	0,0%
	giu	20	7,7	95,0%	6	54,3	83,3%	16	153,1	25,0%
	lug	9	27,0	55,6%	8	71,1	62,5%	11	134,0	63,6%
	ago	16	43,9	12,5%	6	55,3	100,0%	2	75,5	100,0%
	set	15	24,3	66,7%	13	42,6	92,3%	22	191,0	18,2%
	ott	32	8,1	96,9%	32	64,3	71,9%	29	120,2	44,8%
RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA E CON MDC. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC (88.93.B)	mag	1	9,0	100,0%						
	gen	1	8,0	100,0%						

RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)	feb	1	62,0	0,0%						
	apr	1	8,0	100,0%						
	mag	1	10,0	100,0%						
	ott							1	97,0	100,0%
RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO SENZA E CON MDC. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.	gen	3	9,7	100,0%						
	feb	1	8,0	100,0%	1	26,0	100,0%			
	mar	2	9,0	100,0%				8	167,5	0,0%
	apr							3	107,7	66,7%
	mag							1	77,0	100,0%
	giu							1	213,0	0,0%
	lug	1	85,0	0,0%						
	set	2	35,5	50,0%	1	22,0	100,0%	1	238,0	0,0%
	ott				1	59,0	100,0%			
RM DI ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.97.9 e 88.97.C	feb	1	10,0	100,0%				1	141,0	0,0%
	mar	1	8,0	100,0%				2	174,0	0,0%
	apr							1	230,0	0,0%
	ago				1	60,0	100,0%			
	set							1	260,0	0,0%
	ott				1	58,0	100,0%	1	324,0	0,0%
RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE SENZA E CON MDC. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM	gen	9	14,4	88,9%	9	54,9	100,0%	2	21,5	100,0%
	feb	5	22,6	60,0%	6	78,8	83,3%	4	140,8	25,0%
	mar	9	25,9	66,7%	6	49,8	100,0%	12	184,3	25,0%
	apr	7	15,6	85,7%	8	44,6	87,5%	9	109,8	44,4%
	mag	8	9,4	100,0%	2	91,5	50,0%	15	167,2	0,0%
	giu	11	17,6	81,8%	2	55,0	100,0%	12	155,8	25,0%
	lug	7	39,4	42,9%	3	168,0	0,0%	16	186,7	25,0%
	ago	7	44,7	14,3%	2	57,0	100,0%	5	188,4	20,0%
	set	8	8,1	87,5%	10	39,0	100,0%	14	233,5	0,0%
	ott	21	7,8	100,0%	20	63,4	70,0%	13	91,6	69,2%
RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM.	gen	8	11,4	87,5%	7	54,4	100,0%			
	feb	15	11,0	86,7%	7	57,0	85,7%	5	166,4	0,0%
	mar	10	18,3	80,0%	4	58,5	100,0%	12	216,8	0,0%
	apr	14	21,2	64,3%	18	35,7	88,9%	14	97,6	50,0%
	mag	6	7,3	100,0%	5	73,6	60,0%	9	138,2	0,0%
	giu	9	23,0	77,8%	3	59,0	100,0%	11	131,2	45,5%
	lug	5	41,6	40,0%	3	76,0	66,7%	18	143,6	55,6%
	ago	9	43,3	22,2%	4	57,3	100,0%	3	58,3	100,0%
	set	7	16,4	71,4%	10	39,1	100,0%	16	152,8	37,5%
	ott	24	11,4	91,7%	17	66,0	58,8%	22	103,0	54,5%
RM DI INGUINE. SCROTO E/O PENE. Incluso: prima val	mar				1	85,0	0,0%			
RX DEL FEMORE	gen	1	2,0	100,0%	1	24,0	100,0%			
	apr				1	43,0	100,0%	2	47,0	100,0%
	mag				4	45,5	100,0%			
	ago				4	38,5	100,0%			
	set				3	32,0	100,0%			
	gen	4	3,5	100,0%	8	26,8	100,0%			
	feb	7	14,6	57,1%	16	26,0	100,0%	9	33,3	100,0%
	mar	5	7,6	100,0%	11	33,5	100,0%	8	34,8	100,0%
	apr	5	12,2	80,0%	8	41,9	100,0%	7	43,0	100,0%

RX DEL GINOCCHIO	mag	13	16,3	76,9%	5	34,2	100,0%	8	32,5	100,0%
	giu	6	5,7	100,0%	15	40,1	100,0%	9	37,1	100,0%
	lug	1	5,0	100,0%	6	41,7	100,0%	7	52,3	100,0%
	ago	2	3,5	100,0%	10	33,1	100,0%	4	38,5	100,0%
	set	9	7,3	100,0%	4	33,5	100,0%	2	31,0	100,0%
	ott				10	37,1	100,0%	21	39,0	100,0%
RX DEL GOMITO	feb	1	10,0	100,0%						
	mar	1	10,0	100,0%						
	ago	1	5,0	100,0%	3	35,7	100,0%			
RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita	gen	1	8,0	100,0%	2	28,0	100,0%	4	30,0	100,0%
	feb	11	14,3	72,7%	12	28,7	100,0%	4	25,8	100,0%
	mar	2	8,0	100,0%	5	50,4	60,0%	2	34,0	100,0%
	apr	3	21,0	66,7%	2	40,5	100,0%	2	41,0	100,0%
	mag	7	17,6	57,1%				5	39,2	100,0%
	giu	6	6,2	100,0%	6	42,8	100,0%	1	14,0	100,0%
	lug	6	5,3	100,0%	7	29,3	100,0%	4	33,8	100,0%
	ago				5	30,2	100,0%	5	36,8	100,0%
	set	5	6,4	100,0%	4	25,0	100,0%	2	38,0	100,0%
	ott	4	8,5	100,0%	7	33,9	100,0%	7	30,6	100,0%
	gen	3	6,7	100,0%	2	26,0	100,0%			
	feb				1	28,0	100,0%	2	31,0	100,0%
RX DEL POLSO	mar				1	37,0	100,0%			
	apr				1	40,0	100,0%	2	42,5	100,0%
	mag				1	16,0	100,0%	1	43,0	100,0%
	giu	1	7,0	100,0%						
	lug	1	42,0	0,0%						
	set	1	5,0	100,0%	1	60,0	100,0%			
	gen	6	8,8	83,3%	5	25,0	100,0%	9	44,0	88,9%
	feb	10	7,7	90,0%	7	30,3	85,7%	10	27,1	100,0%
RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale	mar	14	9,3	92,9%	11	33,1	100,0%	6	32,2	100,0%
	apr	10	28,5	40,0%	10	38,6	100,0%	8	42,5	100,0%
	mag	13	19,4	61,5%	7	32,9	100,0%	11	39,1	100,0%
	giu	5	5,0	100,0%	15	40,1	100,0%	10	48,0	100,0%
	lug	6	6,5	100,0%	8	40,4	100,0%	3	44,0	100,0%
	ago	8	9,0	87,5%	3	38,0	100,0%	4	35,3	100,0%
	set	3	6,0	100,0%	6	28,5	100,0%	6	53,2	100,0%
	ott	11	8,5	90,9%	5	38,2	100,0%	17	36,1	100,0%
	feb	2	17,0	50,0%						
	mar	2	8,5	100,0%				2	62,5	100,0%
	ott				2	34,0	100,0%			
RX DELLA CAVIGLIA	gen	1	4,0	100,0%	2	28,0	100,0%			
	feb	3	29,0	0,0%						
	mar	1	8,0	100,0%	2	137,5	50,0%			
	apr				1	37,0	100,0%			
	mag	1	8,0	100,0%				1	37,0	100,0%
	giu				2	42,0	100,0%	1	47,0	100,0%
	set	1	7,0	100,0%	2	48,5	100,0%			
	gen	1	6,0	100,0%	4	26,0	100,0%	2	28,0	100,0%
	feb	3	16,7	66,7%	5	35,6	80,0%	6	26,8	100,0%

RX DELLA COLONNA CERVICALE. Incluso: studio dinamico	mar	4	24,3	50,0%	5	64,4	80,0%	3	48,3	100,0%
	apr	2	28,5	0,0%	2	42,0	100,0%	5	38,2	100,0%
	mag	3	30,0	33,3%	3	60,7	66,7%	4	42,3	100,0%
	giu	2	6,0	100,0%	3	31,7	100,0%	4	31,8	100,0%
	lug	2	7,5	100,0%	8	46,1	87,5%	3	44,0	100,0%
	ago	4	6,5	100,0%	5	37,2	100,0%	4	34,3	100,0%
	set	2	9,0	100,0%	8	38,6	87,5%	3	35,3	100,0%
	ott	5	13,8	80,0%	5	33,4	100,0%	4	48,8	100,0%
RX DELLA COLONNA DORSALE. Incluso: studio dinamico	gen				7	49,9	71,4%	2	30,5	100,0%
	feb	1	32,0	0,0%	3	29,0	100,0%	3	33,0	100,0%
	mar	3	16,0	66,7%	3	31,3	100,0%	4	34,8	100,0%
	apr	5	14,6	80,0%	4	47,5	100,0%	5	43,2	100,0%
	mag	3	30,3	33,3%						
	giu	1	10,0	100,0%	3	33,7	100,0%	3	44,0	100,0%
	lug	1	7,0	100,0%	5	49,8	80,0%	3	44,0	100,0%
	ago	4	6,8	100,0%	4	38,5	100,0%	2	40,5	100,0%
	set	2	8,0	100,0%	6	33,5	100,0%	1	32,0	100,0%
RX DELLA COLONNA LOMBOSACRALE. Incluso: studio dinamico	ott	2	22,5	50,0%	3	37,0	100,0%	5	39,0	100,0%
	gen	6	8,0	83,3%	11	29,6	90,9%	5	30,0	100,0%
	feb	3	15,7	66,7%	9	31,6	88,9%	5	56,0	80,0%
	mar	6	18,2	66,7%	4	31,0	100,0%	5	32,2	100,0%
	apr	7	23,6	42,9%	7	45,4	100,0%	10	55,7	90,0%
	mag	5	35,0	40,0%	4	32,8	100,0%	4	42,8	100,0%
	giu	4	8,5	100,0%	9	34,1	100,0%	12	42,4	100,0%
	lug	3	6,3	100,0%	8	37,0	87,5%	7	43,1	100,0%
	ago	5	5,6	100,0%	12	33,3	100,0%	6	38,5	100,0%
RX DELLA GAMBA	set	6	12,2	83,3%	14	32,4	100,0%	2	32,0	100,0%
	ott	7	11,9	85,7%	5	36,2	100,0%	13	48,5	92,3%
	feb	2	8,0	100,0%						
	giu				1	38,0	100,0%			
	lug				2	41,5	100,0%			
	ago				1	24,0	100,0%			
RX DELLA MANO comprese le dita	set	1	7,0	100,0%	1	37,0	100,0%			
	ott				3	32,7	100,0%			
	gen	4	4,5	100,0%	4	27,0	100,0%	3	30,7	100,0%
	feb	1	24,0	0,0%	4	26,0	100,0%	5	36,8	100,0%
	mar	2	9,0	100,0%	4	35,0	100,0%			
	apr	3	5,7	100,0%				8	41,9	100,0%
	mag	2	42,0	0,0%	8	52,5	75,0%	1	43,0	100,0%
	giu							3	55,3	100,0%
RX DELLA SPALLA	lug	5	27,2	40,0%				1	7,0	100,0%
	set	1	5,0	100,0%	2	32,0	100,0%			
	ott	3	9,3	100,0%	6	37,0	100,0%	4	37,0	100,0%
	gen							4	28,5	100,0%
	feb				1	26,0	100,0%	4	30,3	100,0%
	mar	2	21,5	50,0%	4	33,5	100,0%	4	48,8	100,0%
	apr	3	8,3	100,0%	3	43,0	100,0%	1	42,0	100,0%
	mag	3	18,0	66,7%	3	44,3	100,0%	2	42,0	100,0%
	giu	2	8,0	100,0%				2	42,0	100,0%

	lug	2	8,0	100,0%	5	44,2	100,0%	1	43,0	100,0%
	ago	2	5,5	100,0%	1	29,0	100,0%	1	38,0	100,0%
	set	2	7,0	100,0%	3	45,0	66,7%	2	34,0	100,0%
	ott							2	43,0	100,0%
RX STANDARD SACROCOCCIGE. Non associabile a RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE	feb	1	29,0	0,0%						
	ago	1	2,0	100,0%						
SPIROMETRIA SEMPLICE. Non associabile a 89.37.4 TEST DI BRONCODILATAZIONE FARMACOLOGICA	gen	17	8,0	94,1%	13	21,7	92,3%	22	86,6	72,7%
	feb	12	7,8	91,7%	20	20,9	100,0%	22	116,5	63,6%
	mar	18	9,6	88,9%	34	24,1	97,1%	22	145,4	45,5%
	apr	24	7,3	95,8%	29	33,2	96,6%	19	122,6	63,2%
	mag	26	4,2	100,0%	31	28,5	96,8%	28	60,3	75,0%
	giu	26	6,2	92,3%	28	28,2	96,4%	31	75,7	71,0%
	lug	22	12,3	86,4%	33	29,8	100,0%	28	102,9	82,1%
	ago	9	15,2	55,6%	18	60,2	94,4%	18	52,3	88,9%
	set	14	5,8	100,0%	38	30,4	100,0%	23	90,5	69,6%
	ott	16	6,5	100,0%	37	32,1	94,6%	39	83,8	76,9%
TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbite con e senza MCD (87.03.D)	gen	5	8,6	80,0%	2	17,5	100,0%	2	12,5	100,0%
	feb	11	7,8	81,8%	5	35,8	80,0%	4	82,5	50,0%
	mar	7	6,9	85,7%	4	23,5	100,0%	6	72,5	66,7%
	apr	9	16,1	66,7%	6	30,0	100,0%	3	15,7	100,0%
	mag	6	14,7	66,7%	1	11,0	100,0%	6	81,0	50,0%
	giu	7	5,4	100,0%	5	27,0	100,0%	3	98,7	66,7%
	lug	8	48,8	25,0%	1	29,0	100,0%	2	97,0	50,0%
	ago	1	57,0	0,0%				7	160,4	14,3%
	set	5	6,6	100,0%	4	36,5	100,0%	4	53,0	75,0%
	ott	6	6,0	100,0%	4	33,5	100,0%	8	77,4	62,5%
TC CRANIO-ENCEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbite (87.03.C)	gen	7	4,1	100,0%	13	9,7	100,0%	6	10,8	100,0%
	feb	10	6,8	90,0%	22	8,6	100,0%	10	20,0	100,0%
	mar	11	6,4	81,8%	11	14,4	90,9%	15	11,5	100,0%
	apr	7	5,9	85,7%	15	8,9	100,0%	11	20,0	100,0%
	mag	11	3,8	100,0%	19	10,3	100,0%	10	32,2	80,0%
	giu	6	3,8	100,0%	5	3,8	100,0%	6	5,5	100,0%
	lug	6	3,8	100,0%	11	8,7	100,0%	9	17,8	100,0%
	ago	6	7,3	66,7%	12	8,0	100,0%	3	7,7	100,0%
	set	9	3,3	100,0%	12	11,8	100,0%	8	36,1	87,5%
	ott	17	2,9	100,0%	18	11,9	100,0%	13	5,4	100,0%
TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC. Non associabile a	gen				1	3,0	100,0%			
	lug				1	29,0	100,0%			
TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. Non associabile a: TC DEL COLLO (87.03.7)	gen				2	11,0	100,0%			
	feb				1	6,0	100,0%	1	97,0	100,0%
	mar	2	3,5	100,0%	2	76,5	0,0%	1	5,0	100,0%
	apr				4	11,0	100,0%	1	2,0	100,0%
	mag	1	1,0	100,0%				1	2,0	100,0%
	giu	1	7,0	100,0%						
	lug	1	6,0	100,0%				2	23,5	100,0%
	set	2	3,5	100,0%	1	1,0	100,0%			
	ott	2	3,0	100,0%	3	14,0	100,0%			
	gen				1	3,0	100,0%			
TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE	mar	1	1,0	100,0%						

LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC	apr	1	6,0	100,0%						
	mag	1	6,0	100,0%						
	giu				1	7,0	100,0%	1	9,0	100,0%
	lug							1	43,0	100,0%
TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE (88.01.1), TC DELL' ADDOME INFE	gen				5	4,8	100,0%	1	76,0	100,0%
	feb	2	4,5	100,0%	2	4,5	100,0%	1	6,0	100,0%
	mar	1	3,0	100,0%	7	27,9	85,7%	3	11,3	100,0%
	apr				1	8,0	100,0%	3	17,3	100,0%
	mag				3	20,3	100,0%	1	34,0	100,0%
	giu	1	1,0	100,0%	6	22,8	83,3%	1	13,0	100,0%
	lug	1	4,0	100,0%	1	28,0	100,0%	2	6,5	100,0%
	ago	4	4,5	100,0%	1	29,0	100,0%	1	2,0	100,0%
	set	3	3,3	100,0%	3	19,0	100,0%	2	1,0	100,0%
	ott	2	2,5	100,0%	6	9,0	100,0%	1	55,0	100,0%
	gen				1	3,0	100,0%			
	lug	1	5,0	100,0%						
TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL TORACE (87.41), TC DEL TORACE SENZA E	ott	1	1,0	100,0%	2	4,0	100,0%			
	gen							2	45,0	100,0%
TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Non associabile a TC DEL TORACE (87.41), TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (87.41.1), TC TOTAL BODY PER	feb	1	6,0	100,0%	1	21,0	100,0%	1	119,0	100,0%
	mar	1	6,0	100,0%	2	34,5	50,0%			
	mag	1	1,0	100,0%	1	4,0	100,0%			
	giu				1	3,0	100,0%			
	lug							1	43,0	100,0%
	ago	1	7,0	100,0%						
	set	1	5,0	100,0%	3	19,0	100,0%			
	ott	1	4,0	100,0%	2	18,0	100,0%	1	3,0	100,0%
	gen	9	7,3	88,9%	19	20,7	94,7%	18	82,4	88,9%
	feb	19	4,8	94,7%	24	15,2	95,8%	12	126,7	16,7%
TC DEL TORACE [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. Non associabile a 88.38.B e 88.38.E	mar	23	6,3	87,0%	22	17,8	90,9%	23	188,0	8,7%
	apr	13	11,4	69,2%	22	33,4	90,9%	20	155,9	10,0%
	mag	13	11,0	84,6%	26	30,2	100,0%	18	145,8	16,7%
	giu	13	10,8	84,6%	8	48,4	100,0%	24	144,6	45,8%
	lug	13	33,1	46,2%	3	63,7	66,7%	9	132,2	55,6%
	ago	9	23,4	66,7%	12	54,1	100,0%	11	163,0	18,2%
	set	13	8,0	92,3%	14	48,1	92,9%	12	113,9	50,0%
	ott	25	4,2	100,0%	24	27,0	100,0%	20	134,3	25,0%
	gen	13	8,3	84,6%	11	21,2	90,9%	8	82,1	100,0%
	feb	17	6,4	88,2%	15	30,9	86,7%	9	131,4	33,3%
TC DEL TORACE SENZA E CON MDC [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. Non associabile a 88.38.B e 88.38.E	mar	22	8,0	86,4%	18	26,6	100,0%	9	214,2	11,1%
	apr	21	14,2	61,9%	14	32,1	100,0%	4	173,0	0,0%
	mag	13	14,5	53,8%	13	50,2	92,3%	12	164,8	0,0%
	giu	13	23,0	84,6%	5	48,0	100,0%	11	166,5	9,1%
	lug	18	41,1	38,9%	3	40,7	66,7%	19	148,3	36,8%
	ago	12	37,7	41,7%	3	47,0	100,0%	10	187,5	0,0%
	set	11	11,5	90,9%	8	41,9	100,0%	7	131,7	28,6%
	ott	19	5,3	100,0%	19	38,2	94,7%	16	120,9	37,5%
	gen	18	11,7	66,7%	17	19,5	94,1%	8	94,1	100,0%
	feb	30	10,2	93,3%	31	23,1	93,5%	15	148,2	20,0%
	mar	29	5,7	96,6%	33	24,9	97,0%	14	201,9	14,3%

TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.F, 88.38.9	apr	30	12,5	70,0%	24	32,3	100,0%	7	172,1	0,0%
	mag	25	18,7	64,0%	14	51,1	92,9%	15	156,3	0,0%
	giu	27	22,7	74,1%	9	37,8	100,0%	11	159,9	27,3%
	lug	22	40,3	36,4%	5	69,2	60,0%	16	155,9	25,0%
	ago	18	32,4	44,4%	12	53,4	100,0%	9	172,4	11,1%
	set	24	12,2	87,5%	23	41,6	95,7%	15	112,6	46,7%
TC DELL' ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.C	ott	39	5,6	100,0%	27	39,3	92,6%	22	117,8	54,5%
	gen	2	5,5	100,0%	7	16,7	100,0%	4	74,0	100,0%
	feb	8	7,6	75,0%	6	7,8	100,0%	4	109,0	25,0%
	mar	4	4,3	100,0%	7	23,7	85,7%	1	186,0	0,0%
	apr	7	13,4	42,9%	8	33,8	100,0%	1	258,0	0,0%
	mag	2	22,5	50,0%	6	46,2	83,3%	6	153,3	0,0%
	giu	6	14,3	83,3%	3	34,3	100,0%	5	94,2	60,0%
	lug	2	32,0	50,0%	3	46,3	66,7%	2	130,5	50,0%
	ago	8	29,4	50,0%	5	55,4	100,0%	4	123,5	50,0%
	set	4	27,5	50,0%	7	46,6	85,7%	6	89,2	66,7%
TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88	ott	4	3,8	100,0%	4	31,8	100,0%	3	168,0	0,0%
	gen	1	4,0	100,0%	2	4,5	100,0%			
	feb	1	3,0	100,0%						
	mar	2	2,0	100,0%	1	14,0	100,0%	1	1,0	100,0%
	apr	1	9,0	100,0%	1	16,0	100,0%			
	mag	1	6,0	100,0%						
	giu							1	102,0	100,0%
	lug	3	26,7	66,7%				2	210,0	0,0%
	ago	2	31,0	50,0%				1	189,0	0,0%
	set				1	6,0	100,0%			
TC DELL' ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata. Non associabile 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.C	ott	3	7,3	100,0%	1	20,0	100,0%	1	193,0	0,0%
	mar							1	211,0	0,0%
	apr	1	23,0	0,0%						
	giu				1	185,0	0,0%			
	ago	3	31,7	33,3%						
	set	1	3,0	100,0%						
TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC . Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addom	ott	1	2,0	100,0%						
	gen	2	6,0	100,0%						
	feb	1	6,0	100,0%	4	9,5	100,0%			
	mar				2	18,0	100,0%	1	209,0	0,0%
	apr				3	31,7	100,0%	1	265,0	0,0%
	mag	2	27,5	0,0%				1	196,0	0,0%
	giu	1	11,0	0,0%	2	31,5	100,0%	1	119,0	100,0%
	lug	3	70,0	0,0%	2	37,5	100,0%	5	129,0	40,0%
	ago	2	30,0	50,0%	1	58,0	100,0%	2	161,0	0,0%
	set				2	57,5	50,0%	1	184,0	0,0%
TC DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e sur	ott				4	34,8	100,0%	2	135,5	50,0%
	feb	1	7,0	100,0%						
	mar	1	2,0	100,0%						
	apr				1	28,0	100,0%			
	set				2	41,0	100,0%			
	ott				1	25,0	100,0%	1	28,0	100,0%

TC DELLA SELLA TURCICA SENZA E CON MDC (studio selettivo). Non associabile a 87.03.1	ago							1	12,0	100,0%
TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE. Non associabile a 88.39.2, 88.39.3 e 88.39.A	feb	1	12,0	0,0%						
	mar	1	17,0	0,0%	1	71,0	0,0%			
	mag	1	8,0	100,0%						
	lug				1	86,0	0,0%			
	ott				1	15,0	100,0%			
TC MASSICCIO FACCIALE [mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo- mandibolari]	gen	1	5,0	100,0%	3	3,0	100,0%			
	feb				1	15,0	100,0%	1	104,0	100,0%
	mar							3	3,0	100,0%
	apr	4	5,0	100,0%	2	7,5	100,0%	1	6,0	100,0%
	mag	2	3,0	100,0%				1	1,0	100,0%
	giu				1	8,0	100,0%	1	3,0	100,0%
	lug				1	14,0	100,0%	4	9,8	100,0%
	ago	1	6,0	100,0%						
	set	1	4,0	100,0%	2	5,0	100,0%	2	6,5	100,0%
	ott	1	5,0	100,0%	3	7,7	100,0%	1	5,0	100,0%
TC ORBITE (studio selettivo). Non associabile a 87.03	feb				1	7,0	100,0%			
	mag				1	1,0	100,0%	1	44,0	100,0%
	ott	1	8,0	100,0%						
TC ORBITE SENZA E CON MDC (studio selettivo). Non associabile a 87.03.1	giu	1	4,0	100,0%						
TC SELLA TURCICA (studio selettivo) Non associabile a 87.03	feb				1	7,0	100,0%			
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE. Escluso: Test da sforzo cardiopolmonare (89.44.1). Non associabile a 92.05.F, 9	gen							8	265,6	0,0%
	feb				1	78,0	0,0%	8	272,9	0,0%
	mar				1	10,0	100,0%	3	230,7	0,0%
	apr							6	215,3	0,0%
	mag							4	202,5	25,0%
	giu	1	36,0	0,0%				14	202,8	14,3%
	lug							5	143,2	60,0%
	ago				1	42,0	100,0%	5	238,2	0,0%
	set							9	194,6	11,1%
	ott	6	5,7	100,0%	12	30,9	75,0%	9	36,0	100,0%
	gen	5	4,4	100,0%	8	49,1	12,5%	5	237,2	0,0%
	feb	8	7,6	100,0%	8	53,1	12,5%	8	238,0	0,0%
VISITA GENERALE EMATOLOGICA	mar	10	8,9	100,0%	13	58,5	0,0%	17	254,2	0,0%
	apr	14	12,5	92,9%	14	73,9	0,0%	12	232,3	0,0%
	mag	16	11,6	93,8%	15	53,5	6,7%	11	216,8	0,0%
	giu	24	8,1	100,0%	14	52,3	7,1%	8	210,0	25,0%
	lug	25	14,8	88,0%	17	53,1	11,8%	20	113,2	75,0%
	ago	20	6,8	100,0%	15	48,5	6,7%	10	181,9	40,0%
	set	21	8,2	100,0%	17	43,8	35,3%	20	237,9	10,0%
	ott	55	11,2	94,5%	33	104,2	9,1%	34	162,8	17,6%
	gen				18	39,6	16,7%	11	39,2	100,0%
	feb				30	40,9	20,0%	19	43,4	100,0%
VISITA GENERALE GERIATRICA	mar	1	7,0	100,0%	29	52,7	10,3%	42	56,1	95,2%
	apr	1	13,0	0,0%	33	59,3	12,1%	48	57,9	100,0%
	mag	1	6,0	100,0%	37	57,8	5,4%	45	58,7	95,6%

VISITA GENERALE GENITORIA	giu	4	12,0	50,0%	38	56,3	13,2%	35	55,5	100,0%
	lug	3	15,3	66,7%	35	65,2	17,1%	38	68,5	100,0%
	ago	2	22,5	0,0%	24	42,5	33,3%	27	50,7	96,3%
	set	3	2,3	100,0%	37	45,0	13,5%	48	40,1	100,0%
	ott	2	4,0	100,0%	45	41,8	11,1%	58	36,6	100,0%
VISITA GENERALE REUMATOLOGICA	gen	12	5,9	91,7%	16	63,6	12,5%	32	146,0	3,1%
	feb	14	7,3	100,0%	16	51,3	25,0%	51	156,5	2,0%
	mar	25	8,2	100,0%	22	58,7	0,0%	71	173,7	2,8%
	apr	28	10,1	92,9%	28	52,9	17,9%	49	163,7	8,2%
	mag	31	9,5	90,3%	26	59,9	7,7%	73	159,0	11,0%
	giu	33	8,5	100,0%	17	50,5	23,5%	71	149,6	35,2%
	lug	36	10,5	91,7%	31	49,5	19,4%	54	147,7	37,0%
	ago	22	9,2	90,9%	21	60,7	0,0%	38	147,0	31,6%
	set	31	7,1	100,0%	34	54,7	20,6%	51	148,5	17,6%
	ott	26	4,3	100,0%	81	26,5	56,8%	84	43,0	97,6%
	gen	82	5,4	93,9%	100	10,5	95,0%	69	18,6	98,6%
	feb	116	9,6	72,4%	110	12,5	95,5%	107	17,8	98,1%
VISITA GENERALE UROLOGICA. Incluso: esplorazione dei genitali esterni ed esplorazione rettale	mar	98	9,7	75,5%	146	13,7	93,8%	112	16,5	100,0%
	apr	79	7,0	91,1%	106	11,3	97,2%	88	11,7	100,0%
	mag	104	5,6	85,6%	127	12,1	92,9%	96	16,6	97,9%
	giu	86	9,2	83,7%	126	11,4	96,8%	103	17,5	98,1%
	lug	79	9,4	74,7%	119	16,7	89,1%	101	21,1	99,0%
	ago	50	11,7	58,0%	72	19,4	91,7%	76	25,2	98,7%
	set	85	7,5	88,2%	122	9,6	99,2%	88	13,7	100,0%
	ott	102	4,3	98,0%	149	9,8	94,6%	107	12,3	100,0%
	gen	24	6,0	95,8%	25	62,6	4,0%	18	161,6	27,8%
VISITA NEUROLOGICA	feb	28	14,0	82,1%	27	78,2	11,1%	26	173,7	15,4%
	mar	34	10,0	94,1%	33	89,6	6,1%	28	188,8	14,3%
	apr	19	12,6	89,5%	25	73,6	8,0%	31	187,3	9,7%
	mag	30	7,4	96,7%	26	50,4	15,4%	13	145,8	23,1%
	giu	31	9,3	93,5%	25	71,6	8,0%	23	138,6	52,2%
	lug	38	10,5	89,5%	29	50,6	17,2%	22	81,4	95,5%
	ago	28	8,1	85,7%	32	45,1	9,4%	17	86,3	82,4%
	set	39	7,7	97,4%	35	47,1	34,3%	40	164,8	10,0%
	ott	48	4,1	100,0%	53	41,8	41,5%	43	66,1	74,4%